

## Lietuvos infektologų draugijos rekomenduojamas skiepavimo kalendorius Lietuvoje (2023 metai)

Vakcina	Amžius																											
	Iki 24 val.	2-3 paros	1 mėnesio	2 mėnesių	3 mėnesių	4 mėnesių	5 mėnesių	6 mėnesių	12-15 mėnesių	15-16 mėnesių	18 mėnesių	2 metų	6-7 metų	11 metų	15 metų	16 metų	18-19 metų	23 metų	25-26 metų	34-45 metų	46-49 metų	50-59 metų	60-64 metų	65-74 metų	≥75 metų			
Tuberkuilozės vakcina	HepB*																											
Hepatito B vakcina	HepB*																											
Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina																												
B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcijos vakcina																												
Poliomielito vakcina																												
Pneumokokinės infekcijos vakcina																												
Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina																												
Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina																												
B tipo meningokokinės infekcijos vakcina																												
Rotavirusinės infekcijos vakcina																												
Inaktyvinta gripo vakcina																												
Vėjaraupių vakcina																												
Erkinio encefalito vakcina																												
Rekombinantinė juostinės pūslelinės vakcina																												

■ Vakcinai, įtrauktos į Nacionalinį skiepų kalendorių. ■ Vakcinai, įtrauktos į Nacionalinį skiepų kalendorių rizikos grupėms. ■ Papildomai rekomenduojamos vakcinoms.

- BCG – tuberkulozės vakcina, HepB – hepatito B vakcina, DTaP – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės vakcina, Hib – B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina, Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina, IPV – inaktyvinta poliomieliito vakcina, PCV – pneumokokinės infekcijos (konjuguota) vakcina, MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina, RV – rotavirusinės infekcijos vakcina, MenB – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina, Td – difterijos, stabligės vakcina, EEV – erkinio encefalito vakcina, PPSV – pneumokokinė polisacharidinė vakcina, RZV vakcina – rekombinantinė *Herpes zoster* vakcina, VAR – vėjaraupių vakcina, VAR – inaktyvinta gripo vakcina.
- HepB\* – pirmą kartą turi būti įskiepama naujagimiui per 24 val. po gimimo.
- PCV\*\* ir MenB\*\* gali būti skiepjami kartu (vieno vizito metu) su MMR\*\* vakcina.
- HPV\*\*\* skiepjami visi vaikai, skiepimo schema sudaro 2 HPV dozes (tarp 1-os ir 2-os HPV dozės turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesių laikotarpis).
- RV\*\*\*\* 3-ia dozė skiepama, jei skiepama penkivalente RV, ir 3 dozės schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.
- PCV\*\*\*\*\* Valstybės biudžeto lėšomis nuo gripo gali būti skiepjami šioms rizikos grupėms priklausantys asmenys: nėsčiosios (bet kurio nėštumo laikotarpis); asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis nepriklausomai nuo jų amžiaus (taip pat ir vaikai); asmenys, gyvenantys socialinės slaugos ir globos įstaigose (taip pat ir vaikai globos įstaigose); asmenys nuo 65 metų ir vyresni. Skiepama prieš gripo sezoną. Vaikai nuo 6 mėnesių iki 8 metų pirmą kartą skiepiami 2 dozėmis su ≥4 savaitėlių intervalu.
- HepB† skiepimams vykdyti (gimusiems iki 1989 m. 10 mėn. 05 d., HBSaG, anti-HBc ir anti-HBs neįgijantiems asmenims 3 dozėmis po 20 μg kursas pagal schemą 0, 1 ir 6 mėnesius. Jeigu praėjus >1 mėnesiui po 3-ios hepatito B vakcinacijos dozės, anti-HBs yra <10 mTV/ml, rekomenduojama skiepyti iš naujo 3 HepB vakcinacijos dozėmis. Galimos kitos skiepimo schemas pagal vakcinų aprašus. Spėsti, ar reikia skiepyti asmenis, vyresnius nei 60 metų, atsižvelgiant į galimą kontakto riziką.
- PCV, PPSV†† PCV20 arba PCV13 (PCV15) (šiuo atveju praėjus 1 metams papildomai skiriamas PPSV23). Asmenis, anksčiau skiepytus PCV13, rekomenduojama papildomai skiepyti PPSV23 arba PCV20.
- HPV††† skiepimams vykdyti (gimusiems iki 2004 m. 09 m. 01 d.) asmenims 3 dozės kursas pagal schemą 0, 1 (2) ir 6 mėnesius (priklausomai nuo vakcinų gamintojo) iki 45 metų vyrams ir moterims.
- MenB†††† anksčiau neskiepytiems 2 dozės MenB-4C (Bexsero) su mažiausiai 1 mėnesio intervalu tarp dozių arba 2 dozės MenB-FHbp (*Trumenba*) su bent 6 mėnesių intervalu.
- VAR††††† vėjaraupių imunitetui (nesigijusiems vėjaraupiais, juostine pūsleline, neskiepytiems nuo vėjaraupių, esant neįgijamam VZV IgG arba kurių imunitetą bioklė vėjaraupiams nėra žinoma ir nevertojantiems imunosupresinio gydymo) iki 45 metų 2 dozės su 4-8 savaitėlių intervalu pagal vakcinų aprašus.
- EEV††††† erkinio encefalito vakcina 3 vakcinacijos dozės 0, 1-3, 5-12 mėnesius. Pirmoji suspilnamoji dozė skiepama po 3 metų, vėliau – kas 5 metus, nuo 50 metų – kas 3 metus (priklausomai nuo vakcinų gamintojo). Įkandus erkei, vakcinacijos atidėti nereikia.
- RZV†††††††† persirgusiems vėjaraupiais 2 vakcinacijos dozės. Tarp vakcinacijos dozių rekomenduojamas 2-6 mėnesių intervalas.

Į lentelę neįtraukta pockspozicinė (stabligės, pasiutligės ir kt.) profilaktika, vakcinoms keliautojams ir vakcinoms nuo COVID-19 bei bežidžionių raupų dėl besikeičiančios padėties. Dėl papildomai rekomenduojamų vakcinų ir indikacijų rizikos grupių asmenims remtis detalesnėmis rekomendacijomis pagal atitinkamas rizikos būkles.

