

Lietuvos infektologų draugijos rekomenduojamas skiepijimo kalendorius Lietuvoje (2024 metai)

**Vakcinos, ištrauktos iš Nacionalinės skėptų kalendorių.** ■ Vakcinos, ištrauktos iš Nacionalinės skėptų kalendorių rizikos grupėmis. ■ Papildomai rekomenduojamas valčiños.

2. HepB\* pirmoji dozė turi būti iškeliama naujagiminių per 24 val. po gimimo.  
3. PCV\*\*\* ir MenB\*\* gali būti vystoti kartu (vieno vizito metu) su MMR\*\* vakcina.  
4. HPV\*\*\*\* skiepijami visi tankiai, skiepijimo schema 2 HPV'is (tarp priemoksio ir atrosios HPV dozijų turi būti ne trumpesnė kaip 6 mėnesių laikotarpis).  
5. RV\*\*\*\*\* Trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkavalente RV, iš 3 dozijų schema, nurodymo vaistinio preparato charakteristikų sariaukojame.

6. PCV\*\*\* skiepijami rizikos grupų asmenys pagal 2023.05.25 suvestinė redakciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Nr. V-1130 Dėl pneumokokinės infekcijos rizikos grupių patvirtintinuo.  
7. socialinių slaugos ir globos ištagių asmenys: nesėkios (bet kurio nėštumo takotarpis), asmenys lečinimui ligoninis, priklauso nuo jų amžiaus (taip pat ir vaikai); asmenys, gyvenantys socialinių slaugos ir globos ištagių (taip pat ir vaikai) būtini skiepijami šiuos ištakos grupėmis priklausanti asmenys nuo 65 metų ir vyresni. Skiepijama pries sezoną. Vaikai nuo 6 mėnesių iki 18 metų pirmia kartą skiepijamai 2 dozēmis su  $\geq$  2 savaitų intervalu.  
8. HepB<sup>†</sup> neskepijantys valkyste (gimusiems iki 1989 10 05), HBsAg, anti-HBc ir anti-HBs negytiams asmenims 3 dozų po  $\geq$  0,5 μg kurasas pagal schema 0, 1 in 6 mėnesius. Jie, praėjus  $>1$  mėnesių po trečiosios hepatito B vakcinos dozės, anti-HBs yra  $<10$  mTV/ml.

**LID** Lietuvos infektyologų drausija